

#

# ELENCHUS

PLANTARUM

HOR. BOTANICI J. CAR. DINEGRO

*Observationibus quoad novas, vel rariores  
species passim interjectis.*

*Ann. Dinegro*



GENUÆ 1802.


TYPIS DE PLANIS

July 1910

22541

Cei

V833



***L**e rare, e belle specie di Piante introdotte in poco tempo dal Cittadino Gian Carlo Dinegro nel suo Giardino Botanico, di cui egli si è compiaciuto affidarmi la direzione, avendoci procurata la corrispondenza non solo de' primarj Giardini d'Italia, quanto d'Oltramonti, è diventato necessario pubblicarne il presente Catalogo.*

*Il numero delle Piante, che presenta attualmente questo Giardino è ben lungi ancora dal punto cui ha intenzione portarlo il Cittadino Dinegro dopo il suo ritorno d'Inghilterra, dove attualmente rigurgitano le più rare produzioni vegetabili delle due Indie. Ve n'ha però un numero sufficiente, onde allettare e i nostri Corrispondenti, e servire contemporaneamente a un completo corso di Botanica, a cui il favore del Governo, e le cure del Cittadino Dinegro lo hanno per un dato tempo dedicato. A quest'ultimo oggetto è stata mia cura scegliere fra le specie destinate ad abitare questo Giardino, quelle che appartenendo a diverse famiglie di Piante, e presentandone come il modello, potessero nel loro assieme fornire*

*in compendio un'idea del sistema naturale il più filosofico, e il più profondo di quanti ne sono comparsi finora.*

*In questo lavoro non ho creduto attenermi al metodo generalmente adottato nella compilazione de' Cataloghi, i quali non presentando che una lunga e nuda serie di nomi lasciano ad ogni passo nell'incertezza, chi si trova nella necessità di consultarli. Darò un cenno del metodo tenuto da me in questa occasione non colla vana idea di prescrivere con ciò leggi ad altri, ma nella persuasione che adottato questo metodo principalmente da coloro che sono alla direzione di vasti Giardini si verrebbe ad arrestare la confusione, che giornalmente va guadagnando la Botanica sistematica in Italia.*

*Fra le Piante introdotte giornalmente nei Giardini alcune ve n'ha di caratteri talmente equivoci, che ciascheduno le riporta alla specie, cui a suo giudizio pare appartengano; altre recentemente scoperte, e descritte in opere non molto divulgate prendono tanti nomi quanti sono i Botanici nelle cui mani passano; altre finalmente riportate sotto un altro genere illudono sotto la maschera di un nuovo nome, e imbarazzano la scienza di novità immaginarie. In questo stato di cose i Cataloghi dei Giardini Botanici, che a rigore sarebbero destinati a mantenere nella Botanica sistematica quell'ordine che è l'anima di essa, ridotti alla sola esposizione de' nomi riescono la sorgente più feconda di quella orrenda confusione che cimenta la pazienza di più eruditi sistematici, e inceppa i progressi della scienza.*

*Ho riparato a queste dubbiose denominazioni apponendo ai rispettivi nomi delle Piante recentemente descritte, o illustrate il nome dell'Autore, e il titolo dell'opera in cui queste illustrazioni hanno avuto luogo; quando però non fossero già state riportate nell'edizione delle Species Plantarum del celebre Willdenow; nel qual caso ho creduto poter omettere ogni citazione (1). E siccome la semplice citazione dell'Autore lascerebbe gli stessi dubbj sulle Piante, di cui non si conosce che il nome, così v'ho sempre apposto la definizione specifica, o differenziale come la vogliono; mezzo sicurissimo, onde ravvisarne l'identità quand'anche fossero introdotte con diversi nomi. Quando le più recenti opere Botaniche, che mi è riuscito di consultare non mi hanno presentato descrizione alcuna di certe specie, ne ho data io stesso la definizione specifica; col solo oggetto di sottrarle alla pluralità dei nomi; con cui verrebbero tosto contrassegnate dalla inquietezza dei nomenclatori. Ve n'ha fra queste alcune, frutto di mie erborizzazioni in diversi luoghi d'Italia; desse si troveranno completamente descritte in un'opera che spero tra non molto poter pubblicare sotto il titolo Florae Italicae Fragmenta; della quale opera vengono citate le tavole per la maggior parte già disegnate e incise. Avrei aggiunto volentieri l'intera descrizione, e la ta-*

---

(1) Possiedo quest'Opera fino a tutta la Classe Monadelphia. Per le rimanenti Classi me ne sono attenuto all'edizione XIV. come alla più corretta.

*vola delle specie a mia cognizione nuove, o di una oscura determinazione, che non possono entrare nel piano dell'opera testè da me annunciata; ma nol comportavano i limiti assegnati a un Catalogo. Mi sono permesso questa licenza nella sola Nicotiana Plumbaginifolia unicamente per far risovvenire a' Botanici in tanto lusso di tavole, poco, a dir vero, favorevole alla propagazione della scienza, la semplice, e schietta maniera di rappresentare le Piante di Fuchs, e di Plumier. Questa economica semplicità l'ho adottata nelle tavole dell'Opera, che ho annunciato, da me disegnate, e incise. Sarei ben contento di avere il giudizio di qualche Botanico di vaglia sul saggio che ne presento in questa occasione.*

*Le mutazioni fatte in questi ultimi tempi ne' generi Linneani, presentano le specie riformate sotto un aspetto affatto nuovo a chi non può tenersi al giorno di sì fatte innovazioni. Ho riparato questo inconveniente, che porta seco equivoci molto disgustosi nel commercio di Piante, e di Semi, ritenendo in carattere corsivo l'antico genere Linneano, ed aggiungendovi in sinonimo il nuovo, che si trova poscia a suo luogo nell'ordine alfabetico. Non ho creduto dover sempre religiosamente adottare queste mutazioni generiche. Le ragioni che di passaggio ne ho adottate sono il risultato di mie osservazioni, che chiunque potrà ripetere.*

*I Botanici severi mi accuseranno forse di una soverchia prolissità nel riportare alcune troppo*

leggere varietà di alcune specie. Ma si vuol riflettere che non tutti i nostri Corrispondenti sono addetti alle austere leggi Linneane, e che poco, o nulla si potrebbe estrarre da' loro Giardini senza l'allettamento di una Rosa a fior doppio, o di un Ranuncolo screziato a più colori.

V'hanno però delle varietà di un altro genere, che meritano una particolare attenzione. Le costanti varietà nel genere Citrus, pel diverso uso nell'economia domestica de' loro frutti, meritano di essere distinte con tutta quella precisione che è propria ai Botanici; e io mi compiaccio di aver seguitato in ciò l'ottimo esempio dell'illustre Compilatore del Catalogo dell'Orto Accademico Fiorentino. Uguale attenzione meritano le varietà di altre Piante, le quali varietà non è anche ben deciso se siano in origine altrettante vere specie. Gli Aloe, a cagion d'esempio, entrano in questa categoria, ed è appunto nella loro determinazione solamente che mi sono scostato da WILDENOW, per attenermene al giudizioso Autore dell'Hortus Kewensis, che forse in questo ha avuto occasione di poter far maggior numero di osservazioni del Botanico di Berlino.

Tale è il piano che mi sono proposto nella compilazione di questo Catalogo; piano, che se non presenta tutti i vantaggi di cui esso mi pare suscettibile nella sua applicazione in grande, ciò si vuole ascrivere al non contenere ancora questo Giardino quel numero di Piante, a cui verrà portato in seguito. Coloro però che tutti gli anni si trovano nella necessità di consumare gran parte

*del loro tempo nella rettificazione de' nomi malamente apposti alle Piante che ricevono, non sapranno non applaudire all'intenzione che mi ha diretto in questo lavoro.*

*Finirò con fare osservare che la dolcezza del nostro clima favorendo di molto l'efflorescenza, e la fruttificazione di molte Piante de' Paesi Meridionali, si può sperare di poter arricchire annualmente la Botanica d'interessanti osservazioni, proprie principalmente a correggere, o a completare molti generi. Potremo vedere realizzate queste speranze, se il Cittadino Di-negro seguitando collo stesso zelo a promuovere questa scienza, che in grazia sua comincia a far parte della pubblica istruzione in Genova, mentre si guadagnerà da un lato la benemerenzia de' Botanici, acquisterà dall'altro nuovi diritti alla riconoscenza della sua Patria.*

*Genova 2. Luglio 1802.*

**DOMENICO VIVIANI.**



# ELENCHUS

PLANTARUM

H. BOTANICI J. C. DINEGRO.

ANNO 1802.

A

**A**brus praecatorius  
**A**canthus mollis  
 . . . . . spinosus  
**A**cer Pseudo-Platanus  
 . . . . . Negundo  
 . . . . . monspessulanum  
**A**chillea aegyptiaca  
 . . . . . Millefolium  
 . . . . . magna  
 . . . . . Ageratum  
 . . . . . alpina  
 . . . . . odorata  
 . . . . . moschata  
 . . . . . ligustica  
 . . . . . Ptarmica  
 . . . . . tomentosa  
 . . . . . cristata  
**A**chyranthes aspera .  
 . . . . . argentea  
 . . . . . lappacea  
**A**corus Calamus .  
**A**diantum Capillus Veneris .  
 . . . . . fragrans; fronde bipinnata, pinnulis inciso-crenatis obtusis; stipite strigoso.  
 Nob. *Polypodium fragrans*  
 Lin. (1).

**A**donis aestivalis  
 . . . . . vernalis  
**A**egilops incurvata  
 . . . . . triuncialis  
 . . . . . ovata  
**A**eschynomene Sesban .  
 . . . . . americana  
**A**esculus Hippocastanum :  
**A**gave americana .  
 . . . . .  $\beta$  Foliorum  
 . . . . . margine luteo  
 . . . . . virginica .  
 . . . . . lurida .  
**A**geratum conyzoides  
 . . . . . rubens; foliis linearibus trinerviis, sessilibus; floribus fastigiatis; corollis quadridis N. affine A. linearis Cav. Ic. vol. III. t. 206.  
**A**grimonia Eupatoria  
 . . . . . odorata  
**A**grostemma Coeli-rosa  
 . . . . . Coronaria .  
 . . . . . fl. albo;  
 . . . . . Flos Jovis .  
 . . . . . Githago .

(1) *Margo pinnularum reflexus, scariosus, fructificationes obtegit; hinc Adianthi genus patet.*

*Agrostis indica*  
 . . . . . miliacea  
 . . . . . tenacissima  
 . . . . . capillaris  
*Ailanthus glandulosa*  
*Aira scabra*  
 . . . coespitosa  
*Ajuga pyramidalis*  
 . . . reptans  
 . . . . . fl. carneo  
*Aizoon canariense*  
*Albuca altissima* *A. alba* Lam.  
 Enc.  
*Alcea* V. *Althaea* (1)  
*Alchemilla vulgaris*  
 . . . . . hybrida  
*Alcina perfoliata* ; caule erecto ;  
 ramis superioribus di-  
 chotomis ; foliis scabris ,  
 subhastatis , perfoliatis.  
 Cav. Icon. vol. 1. tab. 15.  
*Aletris* V. *Sansevieram* , & *Vel-*  
*theimiam* (2) .  
*Alisma Plantago*  
*Allium Ampeloprasum*  
 . . . . . pallens  
 . . . . . *Schoenoprasum*  
 . . . . . album *Santi Viag.*  
 . . . . . narcissiflorum  
 . . . . . sativum  
 . . . . . fragrans ; seapo tereti ;  
 foliis linearibus carina-  
 natis , obtusis , contortis ,  
 nudis ; staminibus fila-  
 mentis planis. Vent. Jard.  
 de Cels. Planch. 26.  
 . . . . . roseum  
 . . . . . paniculatum  
 . . . . . triquetrum  
 . . . . . vineale

*Aloe perfoliata* . . . . .  
 . . . . .  $\alpha$  arborescens  
 . . . . .  $\beta$  africana  
 . . . . .  $\delta$  succotrina (vera)  
 . . . . .  $\epsilon$  purpurascens  
 . . . . .  $\zeta$  glauca .  
 . . . . .  $\eta$  obscura .  
 . . . . .  $\xi$  humilis .  
 . . . . .  $\theta$  mitraeformis +  
 . . . . .  $\pi$  brevifolia .  
 . . . arachnoides  
 . . . . .  $\beta$  pumila  
 . . . margaritifera  
 . . . . .  $\alpha$  major .  
 . . . . .  $\beta$  minor .  
 . . . verrucosa  
 . . . carinata  
 . . . maculata  
 . . . Lingua  
 . . . plicatilis  
 . . . variegata  
 . . . viscosa  
 . . . spiralis  
 . . . . .  $\alpha$  imbricata .  
 . . . . .  $\beta$  pentagona .  
 . . . retusa  
*Astroemeria peregrina*  
 . . . . . Lightu  
*Althaea officinalis*  
 . . . . . rosea  
 . . . . . ficifolia  
 . . . . . acaulis  
*Alyssum incanum*  
 . . . . . argenteum  
 . . . . . utriculatum  
 . . . . . clypeatum  
 . . . . . sinuatum  
*Amaranthus tricolor*  
 . . . . . Blitum  
 . . . . .  $\delta$  minus rubr.  
 . . . . . viridis

(1) *Alcearum* Genus in minori tantum laciniarum calycis numero statutum , ad *Altheas* a Cavanillio amandatum .

(2) *Aletris* genus diversa staminum insertione , & fructus praesertim structura , in tria genera a nuperis Botanicis dispescitur .

**Amaranthus sanguineus**  
 . . . . . caudatus  
 . . . . . melancholicus  
**Amaryllis lutea**  
 . . . . . formosissima  
 . . . . . sarniensis  
 . . . . . Belladonna  
 . . . . . Athamasco  
 . . . . . undulata  
 . . . . . zeylanica )  
 . . . . . latifolia ) V. Crinum  
**Ambrosia maritima**  
**Anomum Zingiber**  
**Amorpha fruticosa**  
**Amygdalus communis**  
 . . . . . fl. pl.  
**Amyris polygama**  
**Anacyclus valentinus**  
**Anagallis arvensis**  
 . . . . . tenella  
**Anagyris foetida**  
**Achusa italica**  
 . . . . . angustifolia  
 . . . . . officinalis  
**Ancistrum repens**; caulibus re-  
 pentibus; foliis ovato  
 oblongis, argute serratis,  
 lineatis; capitulis  
 globosis. Vent. *Jard. de*  
*Cels. tab. 6.*  
**Andromeda membranacea**. Sp. no-  
 va ex Hort. Cels.  
**Andropogon distachyos**  
 . . . . . Ischaemum  
**Andryala lanata**  
 . . . . . integrifolia  
**Anemone coronaria**  
 . . . . . hepatica  
 . . . . . fl. pl.  
 . . . . . fl. rubro pl.

**Anemone narcissiflora**  
 . . . . . hortensis  
 . . . . . nemorosa  
 . . . . . fl. pl.  
 . . . . . trifolia  
 . . . . . sibirica  
**Annoda** V. Sida (1).  
**Anthemis arabica**  
 . . . . . tinctoria  
 . . . . . nobilis  
 . . . . . fl. pl.  
 . . . . . Cota  
**Anthericum annuum**  
 . . . . . frutescens )  
 . . . . . Asphodeloides ) (2)  
 . . . . . Liliago  
**Antholyza aethiopica**  
 . . . . . Meriana  
**Anthoxanthum odoratum**  
**Anthyllis Barba Jovis**  
 . . . . . cornicina  
 . . . . . vulneraria  
**Antirrhinum triphyllum**  
 . . . . . majus  
 . . . . . fl. albo  
 . . . . . purpureum  
 . . . . . reflexum  
 . . . . . Osyris; foliis lineari  
 lanceolatis, spica laxa;  
 nectario subulato incur-  
 vo; calycis lacinia quinta  
 minima. Cyr. Pl. rar.  
 tab. 24  
 . . . . . Linaria  
 . . . . . Elatine  
**Appium graveolens**  
 . . . . . Petroselinum  
**Apocynum sibiricum**  
**Aquilegia viridiflora**  
 . . . . . vulgaris

(r) *Annodus* Cav. *leviori fructus differentia minus apte a Sidi-  
divelluntur.*

(2) *Binae hac species in Horto quoque Ticinensi, alibique observatae  
cum A. rostrato, & A. longiscapio Jacq. Ic. rar. vol. 2. t. 463., & 413.  
in omnibus conveniunt. An eadem species diverso nomine receptae.*

*Aquilegia vulgaris* fl. albo.

. . . alpina

. . . viscosa

*Arabis* Turrita

. . . hispida

*Arachis hypogaea*

*Arbutus Unedo*

*Arctium Lappa*

*Ardinia hispidosa*

*Arenaria rubra*

. . . serpyllifolia

*Aristolochia Clematitis*

. . . . . sempervirens

. . . . . Siphon

*Artemisia austriaca*

. . . . . vulgaris

. . . . . Abrotanum

. . . . . Dracunculus

. . . . . arborescens

. . . . . Santonica

. . . . . Absintium

. . . . . coerulescens

. . . . . suaveolens Lam. Enc.

. . . . . chinensis

. . . . . Capillifolia Lam. Enc.

*Arum Colocasia*

. . . . . Arisarum

. . . . . Dracunculus

. . . . . sagittifolium

. . . . . maculatum

*Arundo Donax*

. . . . .  $\beta$  versicolor.

*Asarum Europaeum*

*Asclepias syriaca*

. . . . . curassavica

. . . . . nivea

. . . . . incarnata

. . . . . hybrida

. . . . . filiformis

. . . . . fruticosa

. . . . . Vincetoxicum

*Asparagus officinalis*.

. . . . . acutifolius

*Asperugo procumbens*

*Asperula arvensis*

. . . . . tinctoria

. . . . . cynanchica

. . . . . taurina

*Asphodelus fistulosus*

. . . . . ramosus

*Asplenium Adiantum nigrum*.

. . . . . Ceterach

. . . . . Ruta muraria

. . . . . Scolopendrium

. . . . . Trichomanoides

*Aster Amellus*

. . . . . acris

. . . . . macrophyllus

. . . . . chinensis

. . . . . grandiflorus

. . . . . laevis

. . . . . hyssopifolius

. . . . . ericoides

. . . . . cordifolius

. . . . . novae Angliae

. . . . . novi Belgii

. . . . . undulatus

. . . . . linifolius

. . . . . tardiflorus

. . . . . mutabilis

. . . . . dumosus

*Astragalus sesameus*

. . . . . trimestris

. . . . . uralensis

. . . . . austriacus

. . . . . sulcatus

. . . . . contortuplicatus

. . . . . falcatus

. . . . . depressus

*Astrantia major*

. . . . . minor

*Atractylis cancellata*

*Atraphaxis undulata*

*Atriplex Halimus*

. . . . . hortensis

. . . . . hastata

*Atropa Mandragora*

. . . . . arborescens. *Cestrum. cau-*

. . . . . *liferum* Hor. Tic.

. . . . . Physaloides

. . . . . solanacea

. . . . . Belladonna

*Aucuba japonica*.

*Avena fertilis*.

. . . . . sativa

**Avena sterilis**  
 . . fragilis  
 . . fatua.

## B

**Baccharis Ivaefolia**  
**Ballota lanata**  
 . . nigra  
**Basella alba**  
 . . rubra  
 . . lucida  
**Bellis perennis.**  
 . . . . fl. albo pl.  
 . . . . fl. pl. purpureo  
**Berberis vulgaris.**  
**Beta maritima**  
 . . vulgaris  
 . . . .  $\beta$  rubra.  
**Betonica officinalis**  
**Bidens chrysanth**  
 . . pilosa  
**Bignonia radicans.**  
 . . . . Catalpa  
 . . . . capreolata  
 . . . . stans  
**Biserrula Pelecinus**  
**Blitum capitatum**  
**Boerhaavia scandens**  
 . . . . hirsuta  
**Bontia daphnoides. Jacquinia ru-**  
**scifolia Hort. Ticin.**  
**Borago orientalis**  
 . . officinalis  
**Bosea Yervamora**  
**Brassica Eruca.**  
 . . . . orientalis  
 . . . . muralis (1).  
 . . . . oleracea.  
**Briza maxima.**  
 . . media.  
 . . minor.

**Bromus rubens.**  
 . . sterilis  
 . . pinnatus  
 . . distachios  
 . . stipoides  
**Bryonia dioica.**  
 . . alba  
**Buddleja capitata**  
 . . . . salvifolia  
**Buphtalmum frutescens**  
 . . . . grandiflorum  
 . . . . salicifolium  
 . . . . fruticosum  
**Butomus umbellatus**  
**Buxus sempervirens**  
 . . . . fol. varieg.

## C

**Cacalia Anthephorbium**  
 . . . . Ficoides  
 . . . . repens  
 . . . . Kleinia  
 . . . . laciniata  
 . . . . suaveolens  
 . . . . sonchifolia  
**Cactus cylindricus**  
 . . Opuntia.  
 . . tetragonus  
 . . triangularis  
 . . . . fol. variegatis  
 . . . . spinosissimus  
 . . . . Ficus indica  
 . . . . Tuna  
 . . . .  $\beta$  elatior  
 . . . . grandiflorus  
 . . . . Royeni  
 . . . . Phyllanthus  
 . . . . Pereskia  
 . . . . curassavicus  
 . . . . cochenillifer  
 . . . . Pitajaya

(1) *Planta varia denominatione obscurata, optima icone Curt. Fl. Angl. t. III. sistenda. Sisimbriis Linnei auctoritate adgregari nequit, quod hic ex imperfectiori (quoad florem & fructum) Barrelicri icone minus caute fecisse videtur.*

**Cactus pendulus**  
 . . . peruvianus  
 . . . repandus  
 . . . parasiticus  
 . . . moniliformis  
 . . . mammillaris spin. flav.  
    spin. rubr.  
**Calendula officinalis.**  
 . . . . . arvensis.  
**Calla aethiopica.**  
**Callicarpa americana.**  
**Campanula pyramidalis**  
 . . . . . persicifolia  
    fl. pl. albo.  
 . . . . . fragilis Cyril. (1). l.c.  
    *C. cochlearifolia* Vahl.  
    Symb. Bot. p. 18.  
 . . . . . Trachelium  
 . . . . . Rapunculus  
 . . . . . Speculum  
**Camphorosma monspeliaca.**  
**Canna indica.**  
 . . . . . ♂ rubra.  
 . . . . . ♀ lutea.  
 . . . . . γ coccinea.  
**Capparis spinosa.**  
**Capraria biflora.**  
**Capsicum baccatum.**  
 . . . . . grossum  
 . . . . . annuum  
 . . . . . frutescens  
 . . . . . cerasiforme  
**Cardamine hirsuta.**  
**Cardiospermum Halicacabum.**  
**Carduus gnaphaloides, foliis sessilibus, subverticilla-**

tis, lamcolatis, integris,  
 subtus tomentosis. Cyr.  
 l. c. tab. 10.  
 . . . . . argentatus  
 . . . . . spinosissimus  
 . . . . . pycnoccephalus  
 . . . . . lanceolatus  
**Carex virens Lam. Ene.**  
 . . . . . digitata  
 . . . . . pedata  
 . . . . . acuta  
 . . . . . praecox  
**Carlina corimbosa**  
 . . . . . acaulis  
**Carpinus Ostria**  
**Carthamus tinctorius**  
**Cassia ligustrina**  
 . . . . . tomentosa  
 . . . . . marilandica  
 . . . . . nictitans  
 . . . . . bicapsularis  
 . . . . . chamae-crista  
 . . . . . corimbosa  
 . . . . . septemtrionalis Hort. Tic.  
 & Flor. Cassia foliis quadrijn-  
 gis; foliolis ovato-lanceo-  
 latis, acuminatis, nitidis, de-  
 pendentibus, glandula acuta  
 inter singula (Nob.).  
**Cassine Peragua**  
**Catananche coerulea**  
**Caucalis Anthriscus**  
 . . . . . grandiflora  
**Ceanotus africanus**  
**Cecropia peltata**  
**Celastrus buxifolius**  
 . . . . . scandens

(1) *Pulcherrima species optima icone, descriptione, & synonymia a Claris. Cyrillo primum illustrata, quamvis nomine a Vahllo Symb. Bot. vol. 1. p. 13. statuto a Willdenovio recipiatur, ne in synonymia quidem cyrillianæ descriptionis, & iconis mentione habita. Dolendum sane præclarum Cyrilli opus Floræ Italæ ornamentum a Septentrionalibus præsertim Botaniciis, studiose nimis prætermitti. Vide hac occasione opus germanico idiomate scriptum cui titulus Annalen der Botanick in quo nonnullis in Cyrilli opere mendis ultra modum propagatis, novæ plantarum species contra operis illius periodici institutum malitiose reticentur.*

**Celosia cristata**  
 . . . . . *argentea*  
**Celtis australis**  
**Cenchrus capitatus**  
 . . . . . *echinatus*  
 . . . . . *racemosus*  
**Centaurea ragusina**  
 . . . . . *Scabiosa*  
 . . . . . *salmantica*  
 . . . . . *Jacea*  
 . . . . . *Cranus*  
 . . . . . *peregrina*  
 . . . . . *Cineraria*  
 . . . . . *Verutrum*  
 . . . . . *nigra*  
**Cerastium tomentosum**  
 . . . . . *vulgatum*  
 . . . . . *ligusticum* *C. erectum*, villosum; foliis ovatis, acutis; petalis emarginatis calyce duplo longioribus  
 Fl Ital. Fragm. tab. IV.  
**Ceratonia Siliqua**  
**Cercis Siliquastrum**  
**Cestrum nocturnum**  
 . . . . . *diurnum*  
 . . . . . *vespertinum*  
 . . . . . *Parqui*  
 . . . . . *laurifolium*  
**Chamaerops humilis**  
**Chaptalia tomentosa**, ex ort. Cels.  
**Cheirantus fruticosus**  
 . . . . . *maritimus*  
 . . . . . *Cheiri*  
 . . . . . *fl. pl.*  
 . . . . . *sinuatus*  
 . . . . . *annuus*  
 . . . . . *incanus*  
 . . . . . *fenestralis*  
 . . . . . *tricuspidatus*  
 . . . . . *quadrangulus*  
**Chelidonium majus**  
 . . . . . *Glaucium*  
**Chelone campanulata**  
**Chenopodium purpurascens**  
 . . . . . *ambrosioides*

**Chenopodium Bothrys**  
 . . . . . *murale*  
 . . . . . *Vulvaria*  
 . . . . . *hybridum*  
**Chionanthus virginica**  
**Chironia Centaurium**, *Gentiana Centaurium*. Lin.  
**Chlora perfoliata**  
**Chondrilla juncea**  
**Chrysanthemum indicum fl. pl.**  
 . . . . . *Leucanthemum*  
 . . . . . *Myconis*  
**Chrysocoma Linosyris**  
**Cichorium Endivia**  
 . . . . . *Intybus*  
**Cicuta virosa**  
**Cineraria Anelloides**  
 . . . . . *maritima*  
**Cirsium ambiguum**  
**Cissus acida**  
**Cistus salvifolius**  
 . . . . . *hirtus*  
 . . . . . *monspelliensis*  
 . . . . . *incanus*  
 . . . . . *Helianthemum*  
 . . . . . *roseus*  
 . . . . . *angustifolius*  
 . . . . . *creticus*  
 . . . . . *Fumana*  
 . . . . . *guttatus*  
**Citharexylon quadrangulare**  
 . . . . . *pentandrum* *C. ramis obtuse tetragonis: foliis ovato-oblongis subulis pubescentibus; calicibus dentatis; floribus bracteatis pentandris*  
 Vent. Jard. Cels. t. 47.  
**Citrus Medica. Citrum Florentinum odoratissimum.** Mich.  
 Cat. Hort. Flor. p. 27. *Cedrato*.  
 . . . . . *Citrum calice longo crassissimo, & quinquepartito* Mich. l. c. p. 27. *Cedro*.  
 . . . . . *Limon Pyri* *efigie Perrettæ consimilis* Ferr. Hesp. p. 232. *Peretta*.

- . . . . . **Limon dulci medulla**  
**Olyssiponensis**. Ferr. Hesp.  
 p. 250. *Limon dolce*.  
 . . . . . **Limon Amalphita-**  
**nus** Ferr. Hesp. p. 203. tab.  
 207. *Cannarone d' Amalfi*.  
**Citrus medica**. **Limon Genuensis**.  
 Fer. l. c. p. 195. Volk. Hesp.  
 Norim. t. 71. *Limone di Ge-*  
*nova*.  
 . . . . . **Limon Bergamotto**  
**noncupatus**. Volk. l. c. p.  
 156. *Bergamotta*.  
 . . . . . **Pomum Adami com-**  
**mune** Ferr. l. c. p. 313. *Po-*  
*mo d' Adamo*  
 . . . . . **Foliis luteo variegatis**  
**Aurantium**. A. Olyssipo-  
 nense Ferr. l. c. p. 427. *A-*  
*rancio di Portogallo*  
 . . . . . **Foliis angustis ex fla-**  
**vo albo, & subluteo variega-**  
**tis; fructu subrotundo, ses-**  
**sili, luteo, costis virescenti-**  
**bus, cortice trilineari ama-**  
**ro, succo acido**. Targ. App.  
 ad Cat. II. Flor. pag. 118.  
*Arancio Turco*  
 . . . . . **Aurantium Hie-**  
**rochunticum, cortice tenuio-**  
**ri, medulla dulci rubente**.  
 Till. Hort. Pis. 21. tab. 16.  
*Arancio di sugo rosso*  
 . . . . . **Aurantium acri**  
**medulla vulgare** Ferr. l. c.  
 p. 374. & 377. *Arancio forte*  
 . . . . . **Aurantium vir-**  
**gatum angustifolium** Tourn.  
 I.R.H. p. 620. *Arancio a foglie*  
*di salcio*  
 . . . . . **Aurantium cris-**  
**pofolio** Ferr. l. c. 389.  
 . . . . . **Aurantium si-**  
**nense** Ferr. l. c. 433. *Arancio*  
*della China*  
 . . . . . **Decumana Pom-**  
*pa di Genova*
- Claytonia V. Portulacaria**  
**Clematis integrifolia**  
 . . . . . **Vitalba**  
 . . . . . **Flamula**  
 . . . . . **cirrrosa**  
 . . . . . **florida**  
**Cleome gigantea**  
 . . . . . **pentaphylla**  
**Clerodendrum fortunatum**  
**Clinopodium vulgare**  
**Clutia pulchella**  
**Clypeola maritima**  
**Cneorum triscocum**  
**Cochlearia Armoracia**  
 . . . . . **glastifolia**  
 . . . . . **Draba**  
 . . . . . **officinalis**  
**Coix Lacryma**  
**Colchicum autumnale**  
 . . . . . **variegatum**  
**Collinsonia canadensis**  
**Colutea arborescens**  
 . . . . . **frutescens**  
**Comarum palustre**  
**Commelina erecta**  
 . . . . . **virginica**  
 . . . . . **communis**  
**Conium maculatum**  
**Convallaria majalis**  
 . . . . . **fl. pleno**  
 . . . . . **fl. roseo**  
 . . . . . **latifolia**  
 . . . . . **Polygonatum**  
**Convolvulus tricolor**  
 . . . . . **Cantabrica**  
 . . . . . **farinosus**  
 . . . . . **arvensis**  
 . . . . . **pentapetaloides**  
 . . . . . **sepium**  
 . . . . . **Cneorum**  
 . . . . . **siculus**  
**Conyza glutinosa** Lam. Enc.  
 . . . . . **saxatilis**  
**Coreopsis tripteris**  
 . . . . . **alternifolia**  
**Coriandrum sativum**  
**Coriaria myrtifolia**  
**Cornucopiae cuculatum**



**Cornus sanguinea**  
 . . . . . paniculata  
**Coronilla valentina**  
 . . . . . Emerus  
 . . . . . varia  
 . . . . . Securidaca  
**Corrylus Avellana**  
**Cosmos bipinnatus**, foliis connatis bipinnatis; pinnulis linearibus acutis, canaliculatis.  
 Cav. Icon. t. 14.  
 . . . . . sulphureus; foliis connatis, bipinnatis; pinnulis decurrentibus ovato-acutis, ultima longiore Cav. ic. t. 87.  
**Cotyledon orbiculata**  
 . . . . . laciniata  
 . . . . . paniculata  
 . . . . . spuria  
 . . . . . Umbilicus  
 . . . . . nudicaulis  
 . . . . . coccinea  
**Dracopis maritima**  
**Dracopis tetragona**  
 . . . . . perfoliata  
 . . . . . perforata  
 . . . . . imbricata  
 . . . . . cultrata  
 . . . . . obliqua  
 . . . . . rubens  
 . . . . . lingulata  
**Crepis biennis**  
 . . . . . aspera  
 . . . . . barbata  
**Crinum** (1) asiaticum  
 . . . . . americanum  
 . . . . . erubescens *Ait. Kew. C.*  
 . . . . . americanum var. *β. Lin.*  
**Crithmum maritimum**  
**Crocus sativus**  
 . . . . . vernus  
**Crotalaria incana**  
 . . . . . incanescens. *C. arborescens Lam. Enc.*

**Groton ciliato-glanduliferum** C.  
 foliis cordatis integerrimis,  
 ciliato-glandulosis, caule fruticoso *Ort. Dec. IV. t. 9.*

**Cupressus sempervirens** . . . . . *β ramis horizontalibus;*

. . . . . pendula *C. foliis imbricatis glandulosis; frondibus quadrangulis, glaucis; ramis dependentibus* *Her. Stirp. nov.*

**Cyclamen europaeum** . . . . .

**Cynanchum acutum** . . . . .

. . . . . monspeliacum

. . . . . viminale

**Cynara Cardunculus**

**Cynoglossum Omphalodes**

. . . . . officinale

. . . . . pictum

. . . . . sinifolium

**Cyrilla pulchella**

**Cyperus Papyrus**

. . . . . resculentus

. . . . . globosus

. . . . . glomeratus

**Cytisus Laburnum**

. . . . . nigricans

. . . . . Cajan

. . . . . sessilifolius

## D

**Dactylis glomerata**

**Daphne Laureola**

. . . . . Mezerium

. . . . . Gnidium

. . . . . Cneorum

. . . . . odora Hort. Cels.

**Datura Metel**

. . . . . Stramonium

. . . . . fastuosa

. . . . . *β fl. pleno*

. . . . . laevis

(1) Nonnullae Crinorum species ab Heritiero Sert. Angl., & a superioribus reliquis Botanicis ad Amaryllides jure amandantur,

**Daucus** Gingidium  
**Decumaria** barbara  
**Delphinium** Consolida

..... **Ajaci**  
 ..... fl. pl.  
 ..... **Staphisagria**  
**Dianthus** Carthusianorum.

..... **prolifer**  
 ..... **Caryophyllus**  
 ..... chinensis  
 ..... plumarius  
 ..... deltoides  
 ..... superbus  
 ..... monadelphus. **D. squa-**  
 mis calycinis quaternis,  
 lanceolatis, acumina-  
 tis, patulis, tubo brevioribus;  
 petalis crenatis;  
 staminibus monadelphis  
*Vent. Jard. Cels. t. 39.*

**Dictamnus** albus  
**Digitalis** obscura  
 ..... purpurea  
 ..... fl. albo  
 ..... lutea  
 ..... orientalis **D. Epiglottis**  
 Hort. Tic.

..... ambigua  
**Dioscorrea** villosa  
**Diospyros** Lotus  
**Dodartia** orientalis  
**Dodonaea** viscosa  
**Dolichos** sesquipedalis  
 ..... lignosus  
 ..... purpureus  
 ..... Lablab  
 ..... violaceus Hort. Tic.  
 ..... tranquebaricus

**Draba** muralis  
**Dracaena** ensifolia  
**Dracocephalum** canariense  
 ..... Moldavica  
**Drosera** rotundifolia,  
**Duranta** Ellisia  
 ..... **Plumieri**

## E

**Echinops** sphaerocephalus.

**Echium** capitatum.  
 ..... candicans.  
 ..... italicum  
 ..... vulgare.

**Ehretia** Bonrrieria.

**Elaeagnus** angustifolia.

**Encelia** canescens; foliis ovatis,  
 trinerviis, mollibus, al-  
 ternis; floribus corym-  
 bosis. Cav. ic. 1. t. 61.  
*Coreopsis Limensis Jac.*  
*Id. rar. vol. 9. t. 354.*

**Ephedra** distachya.

**Epilobium** tetragonum.  
 ..... angustifolium  
 ..... hirsutum  
 ..... angustifolium

**Epimedium** alpinum.

**Erica** vulgaris.

..... scoparia  
 ..... arborea  
 ..... erbacea  
 ..... umbellata  
 ..... abietina

**Eryngium** planum.

..... tricuspidatum  
 ..... maritimum  
 ..... campestre

**Erysimum** Alliaria

..... Barbarea  
 ..... officinale

**Erythrina** Corallodendrum  
 herbacea

**Erythronium** Dens canis.

**Euclea** racemosa.

**Eupatorium** Ageratoides  
 ..... cannabinum

**Euphorbia** neriiifolia.

..... officinarum  
 ..... caput Medusae  
 ..... segetalis

Euphorbia : :  $\beta$  ( VVild.

. . . . .  $\gamma$  (

. . . . . Tithymaloides

. . . . . padifolia

. . . . . canariensis

. . . . . Tirucalli

. . . . . mammillaris

. . . . . picta

. . . . . Lathyris

. . . . . Helioscopia

. . . . . Paralias

. . . . . Characias

. . . . . Peplus

. . . . . Cyparissias

. . . . . Chamaesices

## F

Ferraria Pavonia.

Ferula nodiflora.

Festuca bromoides.

. . . . . rubra

. . . . . calicina

Ficus pumila.

. . . . . Bengalensis

. . . . . racemosa

. . . . . indica

. . . . . Carica

Fontanesia phyllireoides.

Fragaria chiloensis.

. . . . . vesca

. . . . . var. omnium kalendar.

Fragaria elatior

. . . . . sterilis

Frankenia laevis.

Fraxinus Ornus

. . . . . rotundifolia Lam. Enc.

Fritillaria persica.

. . . . . imperialis

Fumaria bulbosa.

. . . . . officinalis

## G

Galanthus nivalis.

Galega pulchella.

. . . . . officinalis

Gallium verum.

. . . . . Aparine

. . . . . purpureum

Gaura biennis.

. . . . . mutabilis

Genista tinctoria.

. . . . . candicans

. . . . . januensis. G. (inermis)

ramis triquetris; foliis sim-

plicibus margine scariosis,

ramis lanceolatis, cauli-

nis obovatis; legumini-

bis subfalcatis, nudis. Fl.

Ital. fragin. tab. III. (1).

Gentiana Centaurium. Chironia

Centaurium VVild.

(1) *Clas. Heritier in Prodr. Stirp. nov. Genistæ speciem novam nomine G. triquetrae enunciat, descriptam ex specimine in Herbario Tournesfortii servato, qui eam in Insula Palmaria collegerat. Plantam speciei huic valde proximam, ipsa intra mœnia Genuæ crescentem reperi, eamque jam observaverat Amicus meus, Botanicæ eximius cultor, Griolet. Aliam speciem a Tournesfortiana suspicabar, foliis in mea Planta minime ternatis, sed simplicibus. Postremo vero cum Insulam Palmariam, Fucos, cæterasque marinas productiones observandi causa petissem, totamque perlustrarem; ibi solam G. Januensem late vigere observavi. Hinc G. triquetram Her. vel delendam, vel ejus definitionem ex sicco specimine ab Heritiero fortasse minus accurate redactam, autoptica definitione corrigendam esse censerim.*

## Geranium (1) carnosum .

.	peltatum
.	fulgidum
.	alchimilloides
.	tetragonum
.	hybridum
.	β fl. roseo
.	gibbosum
.	glutinosum
.	Radula
.	vitifolium
.	capitatum
.	coriandrifolium
.	triste
.	bicolor
.	inquinans
.	odoratissimum
.	acetosum
.	tomentosum
.	zonale
.	β G. margi-
.	natum Cav.
.	graveolens
.	car. odore rosae P.
.	Radula β VV.
.	quercifolium
.	acerifolium
.	extipulatum
.	cordatum
.	crispum
.	cucullatum
.	myrrhifolium
.	tabulare
.	semitrilobum
.	papilionaceum

Polanconia Jacq. Herit. Ait. Villd.

## Geranium ciconium

.	moschatum
.	cicutarium
.	chium
.	hymenodes
.	malacoides
.	macrorrhizum
.	sanguineum
.	nodosum
.	sibiricum
.	pratense
.	lucidum
.	rotundifolium
.	robertianum
.	dissectum
.	pusillum
.	Geum urbanum
.	Ginkgo V. Salisbaria
.	Gladiolus tristis
.	communis
.	Gleditsia inermis
.	triacantha
.	Globularia vulgaris
.	cordifolia
.	Gloriosa superba
.	Glycine Apios
.	bituminosa
.	Gnaphalium orientale
.	Stoechas
.	fulgidum Xeranthemum fulgidum L.
.	Gomphraena globosa fl. rubro
.	fl. albo
.	fl. varieg.
.	interrupta

Eredia su- Gerania omn. Botanico-  
praeautor.

(1) *Geraniorum synonyma a Jacquinlo, Heritiero, & Cavanillis praesertim recensita ex Spec. Pl. Wilden. petenda; ubi ditissima. In varietate tantum Geranii graveolentis, quae G. Radulae in opere citato refertur, a Cl. Botanici auctoritate recessi; cum varietas haec tantam cum G. graveolente adfinitatem praesferat, ut vix ultra odorem habeas, quo eam dignoscas.*

*Goodenia ovata* (1) Smith Tr. Soc.  
 Lin. Cav. Icon. vol.  
 VI. tab. 506.  
*Gorteria asteroides* Jac. Icon. rar.  
 tab. 591.  
*Gossypium herbaceum*  
 . . . . . *religiosum*  
*Gratiola officinalis*.  
*Grevia occidentalis*.  
*Guilandina* Bondue.  
*Gypsophila altissima*.  
 . . . . . *Struthium*  
 . . . . . *Saxifraga*

## H

**H***aemanthus puniceus*.  
 . . . . . *coccineus*  
*Halleria lucida*.  
*Haloragis Cercodia* VVild. H. Te-  
 tragonia Herit. H. *afata*  
 Jacq. Forst.  
*Hedera Helix*.  
 . . . . . *quinquefolia* V. *Vitis*.  
*Hedysarum coronarium*.  
 . . . . . *canadense*.  
 . . . . . *canescens*  
 . . . . . *hirtum*  
 . . . . . *gyrans*  
 . . . . . *Onobrychis*  
*Heliantus multiflorus*.  
 . . . . . *annuus*  
 . . . . . *fl. pl.*  
 . . . . . *tuberosus*  
 . . . . . *angustifolius*  
*Heliotropium peruvianum*.  
*Heliophila pendula*.  
*Helleborus viridis*.  
 . . . . . *foetidus*  
 . . . . . *niger*  
*Hemerocallis flava*.  
 . . . . . *fulva*

*Herniaria glabra*.  
*Hesperis matronalis*.  
 . . . . . *verna*  
*Hibiscus Trionum*  
 . . . . . *syriacus*  
 . . . . . *fl. albo pl.*  
 . . . . . *fl. rubro pl.*  
 . . . . . *Sabdariffa*  
 . . . . . *phoeniceus*  
 . . . . . *mutabilis*  
 . . . . . *fl. pl.*  
 . . . . . *Rosa sinensis fl. roseo*.  
 . . . . . *fl. atro rub.*  
 . . . . . *cannabinus*  
 . . . . . *militaris* Cav. H. *lae-*  
*vis* Scop.  
 . . . . . *Abelmoscus*  
 . . . . . *Maniot*  
*Hieracium aurantiacum*  
 . . . . . *murorum*  
 . . . . . *praemorsum*  
*Holcus saccharatus*  
 . . . . . *bicolor*  
*Hordeum Zeocriton*  
 . . . . . *nodosum*  
 . . . . . *murinum*  
*Humulus Lupulus*  
*Hycanthus orientalis*.  
 . . . . . *Muscari*  
 . . . . . *monstruosus*  
 . . . . . *racemosus*  
 . . . . . *comosus*  
 . . . . . *Botryoides*  
*Hydrocharis Morsus ranae*  
*Hyosciamus albus*  
 . . . . . *niger*  
 . . . . . *pusillus*  
*Hyoseris radiata*  
 . . . . . *Rhagadioloides*  
 . . . . . *cretica*  
*Hypericum Androsaemum*  
 . . . . . *calycinum*  
 . . . . . *perforatum*

(1) *Characterem genericum quoad corollam a clarissimis Smithio & Cavanillio in sicco specimine minus exacte definitum, optima licone, & descriptione Ventenatii in opere cit. t. 3, restauravit.*

*Hypericum hircinum*  
*Hyssopus officinalis*.

## I

**J**  
*Jasione montana* .  
*Jasminum humile* .  
 . . . . *grandiflorum*  
 . . . . *odoratissimum*  
 . . . . *fruticans*  
 . . . . *azoricum*  
 . . . . *officinale*  
 . . . . *Sambac* VV. *Nictan-*  
                   *thes Sambac* Lin.  
*Jatropha urens* .  
*Iberis amara* .  
 . . . . *umbellata*  
 . . . . *semperflorens*  
 . . . . *sempervirens*  
 . . . . .  $\beta$  *garre-*  
                   *xiana* .  
 . . . . *gibbaltarica*  
 . . . . *saxatilis*  
*Ilex Aquifolium*  
*Illecebrum lanatum*  
 . . . . . *capitatum*  
*Impatiens Balsamita*  
*Indigofera argentea* .  
 . . . . . *tinctoria*  
*Inula Helenium*  
 . . . . . *hirta*  
*Inula disenterica* .  
 . . . . *Oculus-Christi*  
*Ippomoea coccinea* .  
 . . . . . *Quameclit* .  
 . . . . . *violacea*  
 . . . . . *hederifolia*  
 . . . . . *Pes tigridis*  
 . . . . . *Bona-nox*  
 . . . . . *heterophylla* I. *foliis*  
                   *palmaris planis, lobu-*  
                   *lis lateralibus superne*  
                   *lobulo erectiusculo au-*  
                   *ctis.* Ort. Dec. 1,  
*Iris germanica* ,  
 . . . . *graminea*

*Iris Pseudo-acorus*

. . . . *florentina*  
 . . . . *Xiphium*  
 . . . . *susiana*  
 . . . . *tuberosa*  
 . . . . *pallida*  
 . . . . *sibirica*  
 . . . . *squallens*  
 . . . . *foetida fol. varieg.*  
 . . . . *variegata*  
 . . . . *pumila*  
 . . . . *versicolor*  
 . . . . *persica* .  
 . . . . *sambucina* .  
 . . . . *ochroleuca*  
 . . . . *fimbriata* ( *barbatae foliis*  
                   *ensiformibus* ) I. *foliis sca-*  
                   *po compresso multifloro vix*  
                   *brevioribus; stigmatibus fim-*  
                   *briatis.* Vent. Jard. Cels. t. 9.

*Isatis tinctoria* .

*Juglans nigra* .

*Juniperus communis* .

. . . . . *Sabina*

. . . . . *virginiana*

*Jussiena erecta* .

*Justicia Adhatoda*

. . . . . *hyssopifolia*

*Ixia Bulbocodium*

. . . . . *corumbosa*

. . . . . *crocata*

. . . . .  $\alpha$  *floribus croceo ru-*  
                   *fescentibus* VVild.

. . . . . *maculata*

*Ixora coccinea* .

. . . . . *americana*

## K

**K**  
*Kaempferia Galanga*

*Koelreuteria paniculata*

*Knautia orientalis* .

*Killinga triiceps* .

## L

**L**  
*Lactuca segusiana* ;

**Lactuca quercina**  
 . . . . . sativa  
 . . . . . Scariola  
**Lagurus exilidriens.**  
**Lamium amplexicaule.**  
**Lantana aculeata.**  
 . . . . . Caenara  
 . . . . . trifolia  
 . . . . . odorata  
 . . . . . Radula  
**Laserpitium gallicum.**  
**Lathyrus Clymenum**  
 . . . . . odoratus  
 . . . . . tingitanus  
 . . . . . silvestris  
**Laurus nobilis.**  
 . . . . . Benzoin  
**Lavandula multifida.**  
 . . . . . fl. albo  
 . . . . . pinnata  
 . . . . . dentata  
 . . . . . Stoechas  
 . . . . . heterophylla ex H.  
 Tic. L. foliis sessilibus,  
 ellipticis, dentato-incisis,  
 linearibusque; spica cylindrica  
 (Nob.)  
 . . . . . abrotanoides  
 . . . . . Spica  
 . . . . .  $\beta$  latifolia.  
**Lavatera maritima.**  
 . . . . . arborea  
**Leontodon Dalechampi.**  
 . . . . . Taraxacum  
**Leonurus Cardiaea.**  
 . . . . . tataricus  
**Lepidium sativum.**  
 . . . . . latifolium  
 . . . . . Iberis  
 . . . . . perfoliatum

**Leucojum vernum:**  
 . . . . . aestivum  
**Ligusticum Levisticum**  
**Ligustrum vulgare.**  
**Lilium candidum.**  
 . . . . . bulbiferum  
**Linum maritimum.**  
 . . . . . gallicum  
 . . . . . peregrinum  
 . . . . . usitatissimum  
 . . . . . campanulatum  
 . . . . . tenuifolium  
 . . . . . catharticum  
**Liriodendrum Tulipifera.**  
**Lithospermum officinale.**  
 . . . . . Graminifolium;  
 foliis linearibus;  
 floribus spicatis,  
 cymosis; secundis. Flor. Ital.  
 fragm. tab. 9.  
**Pulmonaria** ~~officinalis~~ *ruffructosa*  
~~officinalis~~ Lin. (1).  
**Lobelia Cardinalis**  
 . . . . . longiflora  
**Lolium perenne.**  
 . . . . . temulentum  
**Lonicera pyrenaica.**  
 . . . . . Symphoricarpos  
 . . . . . Caprifolium  
 . . . . . sempervirens  
 . . . . . Diervilla  
 . . . . . Periclymenum  
 . . . . .  $\beta$  serotina  
 . . . . .  $\delta$  quercifolia  
 . . . . . Xylosteum  
**Lopezia mexicana**  
**Lotus hirsutus**  
 . . . . . jacobaeus  
 . . . . . tetragonolobus

(1) In viva Planta collatis characteribus genericis a *Palmonariis*,  
 ad *Lithospermata* speciem hanc, admodum raram, amandandam esse  
 pnicuique patebit.

Lotus Doricnium  
 . . . recta  
 . . . corniculata  
 Lunaria annua .  
 Lupinus hirsutus .  
 . . . albus  
 Lychnis dioica .  
 . . . chalcedonica  
 . . . . . fl. pl. /  
 . . . Viscaria fl. pl.  
 . . . coronata Thumb. Jap.  
 . . . *L. grandiflora* Jacq. Coll.  
 . . . Flos cuculi  
 Lycium barbarum .  
 . . . europaeum  
 . . . afrum  
 . . . boerhaviaefolium  
 Lygeum Spartum .  
 Lysimachia vulgaris .  
 . . . . . Ephemerum  
 . . . . . punctata  
 Lythrum Salicaria  
 . . . . . ~~virgatum~~

## M

**M**adia viscosa; foliis sessilibus,  
 sublancoolatis, viscosis; floribus axillari-  
 bus Cav. Icon. Pl.  
 Magnolia grandiflora,  
 Malva scoparia .  
 . . . verticillata  
 . . . fragrans  
 . . . silvestris

Malva crispa  
 . . . americana  
 . . . rotundifolia  
 . . . spicata  
 . . . caroliniana  
 Marrubium candidissimum;  
 . . . acetabulosum  
 . . . supinum  
 . . . crispum  
 . . . Pseudo-Dictamnus  
 . . . Alyssum  
 Martynia diandra ) (1)  
 . . . proboscidea ) (1)  
 . . . perennis *Gloxinia macu-*  
*lata* Herit. St. nov. i. p.  
 149. (2).  
 Matricaria Parthenium fl. pl.  
 Maurandia semperflorens Jacq.  
 . . . H. Schoemb. *Usteria*  
*scandens*. Cav. ic.  
 Medeola asparagoides .  
 . . . . . angustifolia  
 Medicago arborea .  
 . . . . . sativa  
 . . . . . maritima  
 Melia Azederach  
 . . . . . sempervirens  
 Melianthus major .  
 . . . . . minor;  
 Melica nutans .  
 . . . . . Bahuini  
 Melissa officinalis .  
 . . . . . Nepeta  
 . . . . . Calamintha  
 . . . . . grandiflora  
 . . . . . fruticosa

(1) Duo hae species a Linneo nomine *M. annuae* confusae; recentiorum cura nunc distinctae.

(2) *Gloxinia* genus in *Martyniarum* decrementum parum solide meo iudicio, ab *Heritiero* statutum. Nam in *M. peremni* filamenta reapse corollae, minime vero receptaculo inserta; quod evulsa corolla cuiusque patet. Nectarium quoque studiose nimis in hac specie ab *Heritiero* exaltatur, cum in *Martyniae* caractere Linneano gibbositate mellifera nomine abunde inspectum fuisse videatur.



**Mentha viridis**  
 . . . Piperita  
 . . . Pulegium  
 . . . gentilis  
 . . . aquatica  
 . . . citrata  
 . . . cervina  
 . . . crispa  
 . . . niliaca  
 . . . rotundifolia  
**Menianthes trifoliata**  
 . . . Nymphoides  
**Mercurialis annua**  
 . . . perennis  
 . . . elliptica; dioica, suf-  
 fruticosa, brachiata,  
 glaberrima, foliis el-  
 lipticis serratis, den-  
 tibus glandulosis;  
 stipulis reflexis.  
 Vent. Jar. Cels. 2. livr.  
 tab. 2.

**Mesembryanthemum noctiflorum**  
 . . . calamiforme  
 . . . cordifolium  
 . . . deltoides  
 . . . linguiforme  
 . . . barbatum  
 . . .  $\gamma$  densum  
 . . . uncinatum  
 . . .  $\beta$  perfolia-  
 tum unci-  
 natum dia-  
 canthos Plu-  
 rium Catal.  
 . . . dolabriforme  
 . . . glaucum  
 . . . crassifolium  
 . . . cristallinum  
 . . . tortuosum  
 . . . geniculiflorum  
 . . . splendens  
 . . . filamentosum  
 . . . nodiflorum  
 . . . tenuifolium  
 . . . verruculatum  
 . . . glomeratum

**Mesembryanthemum hispidum**  
 . . . acinaciforme  
 . . . corniculatum  
 . . . fruticosum  
 . . . forficatum  
 . . . spinosum  
 . . . falcatum

**Metrosideros Diosmaefolia** Ex,  
 Hort. Cels.

**Mespilus pyracantha**  
 . . . Cotoneaster

**Messerschmidia fruticosa**

**Milleria angustifolia; foliis linea-  
 ri-acutis, connatis, tri-  
 nerviis, obsolete serra-  
 tis** Cav. Ic. Pl. vol. 3,

**Mimosa virgata**  
 . . . farnesiana  
 . . . pudica  
 . . . leucocephala Lam. Enc.  
 . . . plena  
 . . . sensitiva  
 . . . eburnea

**Minuartia campestris**

**Mirabilis Jalappa**  
 . . . longiflora

**Moringia mucosa**

**Mollucella laevis**  
 . . . frutescens  
 . . . spinosa

**Momordica Elaterium**  
 . . . Luffa

**Monarda Clinopodia**  
 . . . didyma  
 . . . punctata

**Moræa chinensis**  
 . . . ensifolia

**Morus papyrifera**  
 . . . alba

**Myragrum sativum**  
 . . . perfoliatum

**Myosotis scorpioides**

**Myrica quercifolia**

**Myrsine africana**

**Myrtus communis**  
 . . . fol. varieg.

*Myrtus communis*  $\beta$  tarentina  
 fl. pl.  
 . . . . .  $\delta$  boetica  
 . . . . .  $\beta$  lusitanica

## N

**N**arcissus Jonquilla  
 . . . . . odorus  
 . . . . . Pseudo-narcissus  
 . . . . . Tazzetta  
 . . . . . fl. albo  
 . . . . . poeticus  
*Nepeta* pannonica  
 . . . . . Cataria  
 . . . . . hirsuta  
 . . . . . incana  
 . . . . . italica  
 . . . . . violacea  
 . . . . . longiflora  
*Nerium* oleander  
 . . . . . fl. albo )  
 . . . . . fl. rubro) pleno  
 . . . . . fl. luteo  
*Nicotiana* Tabacum  
 . . . . . fruticosa  
 . . . . . plumbaginifolia ; fo-  
 liis caulinis lineari-lanceo-  
 latis, undulatis, semiample-  
 xicaulis : caule tubercu-  
 lato ; laciniis calicinis acu-  
 minatis. V. Tab.

Caulis a basi ipsa in  
 ramos divisus, paniculatus,  
 flexuosus, tuberculatus, hi-  
 spidus.

Folia radicalia in or-  
 bem posita ovato-obtusa, ba-  
 si coarctata, reliqua lineari-  
 lanceolata, undulata, rigi-  
 dula.

Flores racemosi ; pe-  
 dunculi solitarii, alterni,  
 inferiores uniflori, superio-  
 res 2-3flori.

Calicis laciniæ lanceo-  
 latæ, acuminatæ, carinatæ.

Corolla clavata ; tubo  
 adtenuato ; limbi laciniis ova-  
 tis, acutis, plicatis, paten-  
 tibus. *Reliqua generis* (1)

*Nigella* orientalis  
 . . . . . damascœna  
 . . . . . sativa

*Nolana* prostrata  
*Nymphæa* alba  
 . . . . . lutea

**O**ryzum gratissimum  
 . . . . . minimum

(1) *Planta Patriæ incertæ. In Horto academico Mediolanensi. eam paucis ab hinc annis sponte vigere ab hujus Horti Cultore didici. Suspicio hybridismi, quem in hoc genere Kohlreuterianis experimentis (Vorläufige Nachrichten von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffendem versuchen ec.) late patere cognoveram, observationibus per tres annos diversis in Hortis institutis, evanuit. Tabulam a me delineatam, & ære sculptam addo, nomine ex maxima cum foliis Plumbaginis europææ similitudine petito, quamvis Innovatores quidam, nomina potius a rei veritate absona, quam aliena recipere solliciti, & cerintifoliam, & cerintoidem dixerint ;*

. . . . . sentellarioides (1)  
 . . . . . Basilicum  
 . . . . . *B. carrophyll-*  
                   latum ma-  
                   xinum Bah.  
                   pin. 226.  
                   foliis nigris  
 Oenothera biennis  
                   mollissima  
                   nocturna  
                   tetraptera  
                   rosea  
                   odorata  
 Olea fragrans  
                   americana  
 Ononis fruticosa  
                   spinosa  
                   natrix  
                   minutissima  
 Onopordon acaule  
 Ophrys arachnites  
                   labio inferiori u-  
                   trinque appen-  
                   dice triangula-  
                   ri aucto (2).  
                   myodes  
                   spiralis  
 Orchis bifolia  
                   Conopsea  
                   odoratissima  
                   pyramidalis  
                   mascula

Orchis latifolia  
                   maculata  
                   ustulata  
 Origanum Dictamnus  
                   vulgare  
                   Majorana  
                   Onites  
 Ornithogalum arabicum  
                   umbellatum  
                   candatum  
                   nutans  
                   pyramidale  
 Ornithopus scorpioides  
 Orobus niger  
                   vernus  
                   angustifolius  
 Osmunda regalis  
 Osteospermum cœruleum  
                   moniliferum  
 Osyris alba  
 Othonna cheirifolia  
 Oxalis versicolor  
                   incarnata  
                   purpurea  
                   corniculata  
                   pes capræ

## P

Paeonia officinalis fl. rubro pl.  
                   fl. pl. roseo  
                   tenuifolia

(1) *Deleatur synonym. Majorana rubra Rumph. Amb. 5. p. 291. t. 101. quod ad O. gratissimum, collatis Jacquinii, & Rumphii tabulis referri debet. Item in O. gratissimo synonymum Burm. Zeyl. 174. t. 80. f. 1. recipiendum dempto synonym. H. Mal. T.X. tab. 77. p. 155. ubi diversa omnino Planta, maxime quoad efflorescentiam repræsentatur. Idem quoque Burmannus in indice Linneano, Horto Malab. a seipso appposito O. gratissimum ad Katta-Tritava tab. 86. Vol. X. ejusdem operis reducit. Eadem fere inextricabilis confusio in aliquibus aliis Ocymorum speciebus.*

(2) *Hic referri debet Orchis cretica maxima flore pallii episcopalis forma Tourn. Voyag. v. 1. p. 12. cum tab. An species distincta? Plenior descriptionem in Fl. Ital. Fragm. exponam.*

- Panicum virgatum**  
 . . . . . attenuatum  
 . . . . . Crux galli  
 . . . . . sanguinale  
 . . . . . Dactilon  
 . . . . . latifolium . An Cinna  
 arundinacea, vel A-  
 rundo Bambos ap-  
 pellari debeat, in  
 omnibus fere Italiae  
 Hortis Botanicis, ubi  
 nonquam floruit, ac-  
 riter disputatur.
- Papaver Rhoeas**  
 . . . . . somniferum  
 . . . . . hybridum  
**Parnassia palustris**  
**Passiflora lutea**  
 . . . . . caerulea  
 . . . . . Murucuja  
 . . . . . rotundifolia  
 . . . . . suberosa  
 . . . . . minima  
 . . . . . incarnata  
 . . . . . holosericea  
 . . . . . angustifolia  
**Pavonia spinifex** } V. Hibi-  
 . . . . . praemorsa } scus  
 . . . . . Columella }  
**Peganum Harmala**  
**Perilla Ocyroides**  
**Periploca graeca**  
**Petiveria alliacea**  
**Peucedanum officinale**  
**Phalaris arundinacea**  
 . . . . .  $\beta$  picta  
 . . . . . paradoxa  
 . . . . . canariensis  
 . . . . . pubescens Lam. Enc. (1).  
 . . . . . *Aira pubescens* VV.  
**Phaseolus lunatus**  
 . . . . . Caracalla
- . . . . . semierectus  
 . . . . . vulgaris  
 . . . . . inamoenus  
 . . . . . farinosus  
 . . . . . radiatus  
**Phyladelphus coronarius**  
 . . . . . inodorus  
**Phillyrea latifolia**  
 . . . . . media  
 . . . . . angustifolia  
**Phleum nodosum**  
**Phlomis fruticosa**  
 . . . . . tuberosa  
 . . . . . Leonurus  
 . . . . . Herbaventi  
 . . . . . zeylanica  
**Phlox glaberrima**  
 . . . . . carolina  
 . . . . . paniculata  
**Phoenix dactylifera**  
**Phytica ericoides**  
**Phyllanthus Niruri**  
**Physalis pubescens**  
 . . . . . somnifera  
 . . . . . curassavica  
 . . . . . angulata  
 . . . . . Alkekengi  
 . . . . . barbadensis  
 . . . . . pruinosa  
**Phytolacca decandra**  
 . . . . . octandra  
 . . . . . abissinica P. lutea  
 . . . . . Hort. Tic.  
 . . . . . icosandra  
**Pinguicula vulgaris**  
**Pinus sylvestris**  
 . . . . . maritima Lam.  
 . . . . . balsamea  
 . . . . . Abies  
**Piper medium**  
 . . . . . pereschiaefolium

(1) Tanta congeneribus adfinitate conjungitur, ut ad Airas nullo pacto aggregari possit :

Pistacia vera  
 . . . . . Lentiscus  
 . . . . . Terebinthus  
 Pisum Ochrus  
 Plantago Coronopus  
 . . . . . major  
 . . . . . lanceolata  
 . . . . . Cynops  
 . . . . . Psyllium  
 Platanus orientalis  
 Plumbago europea  
 . . . . . zeylanica  
 . . . . . rosea  
 Poa abyssinica  
 . . . . . pratensis  
 . . . . . Molineri  
 . . . . . annua  
 Podalyria australis *Sophora au-*  
*stralis* Lin.  
 Polyanthes tuberosa  
 . . . . . fl. pl.  
 Polycarpum tetraphyllum  
 Polygala vulgaris  
 . . . . . amara  
 Polygonum orientale  
 . . . . . fl. albo  
 . . . . . Fagopyrum  
 . . . . . frutescens  
 . . . . . Persicaria  
 . . . . . aviculare  
 Polymnia Uvedalia  
 Polypodium vulgare  
 . . . . . Filix mas  
 Populus alba  
 . . . . . balsamifera  
 Portulaca Anacampseros  
 . . . . . pilosa  
 . . . . . oleracea  
 . . . . . patens V. Talinum  
 Portulacaria afra V. Claitonia  
 Potamogeton natans  
 Potentilla Anserina  
 . . . . . recta  
 . . . . . argentea  
 . . . . . reptans

Poterium spinosum  
 . . . . . Sanguisorba  
 Prasinum majus  
 Primula veris fl. dupl.  
 . . . . . fl. dupl. rubr.  
 . . . . .  $\alpha$  officinalis  
 . . . . . elatior  $\beta$  acaulis  
 . . . . . fl. roseo  
 . . . . . farinosa  
 . . . . . Auricula  
 . . . . .  $\beta$  fl. purp.  
 . . . . . auriculata; foliis ova-  
 to-oblongis, obtusis;  
 superne denticula-  
 tis; utrinque subpul-  
 verulentis, involu-  
 cri foliolis basi auric-  
 ulatis. Vent. Jard.  
 Cels. Tab. 4a.

Prunus Laurocerasus  
 . . . . . Avium  
 . . . . . domestica  
 Psoralea bituminosa  
 . . . . . aculeata  
 . . . . . americana  
 . . . . . glandulosa  
 Pulmonaria officinalis  
 . . . . . ~~suffruticosa~~ (t) V. Li-  
 thospermum  
 Punica Granatum  
 Pyrus spectabilis  
 . . . . . Aria *Crataegus Aria*. Lin.

## Q

Quercus Suber  
 . . . . . Ilex

## R

Ranunculus repens  
 . . . . . asiaticus  
 . . . . . parviflorus  
 . . . . . Ficaria  
 . . . . . rutefolius

(1) Pro *Pulmonaria* ~~suffruticosa~~ *suffruticosa* aliam omnino a Linneana diver-  
 sam speciem aliquibus in Italia Hortis cultam vidi.

Ranunculus auricomus  
 . . . . . Flammula  
 . . . . . tuberosus  
 Reseda Luteola  
 . . . . . odorata  
 . . . . . Sesamoides  
 Rhamnus Alaternus  
 . . . . . fol. luteo var.  
 . . . . . catharticus  
 . . . . . *Paliurus* ) V. Zizyphus  
 . . . . . *Zizyphus*  
 . . . . . Frangula  
 Rheum compactum  
 . . . . . Rhaponticum  
 Rhus Copallinum  
 . . . . . Typhinum  
 . . . . . radicans  
 . . . . . Cotinus  
 . . . . . glabrum  
 . . . . . lucidum  
 . . . . . lævigatum  
 . . . . . Coriaria  
 Ribes Grossularia  
 . . . . . rubrum  
 . . . . . nigrum  
 Ricinus communis  
 . . . . . lividus Jacq.  
 Ricotia ~~apocynum~~  
 Rivina lævis  
 . . . . . humilis  
 Robinia Pseudo-acacia  
 . . . . . Garagana  
 . . . . . frutescens  
 . . . . . spinosa  
 . . . . . hispida  
 . . . . . viscosa racemis axillari-  
 . . . . . bus ovatis erectis; fo-  
 . . . . . liis impari pinnatis;

ramis viscoso glandu-  
 losis. Vent. Jard. Cels.

Rosa lutea  
 . . . . .  $\beta$  bicolor  
 . . . . . cinnanomea  
 . . . . . fl. pl.  
 . . . . . arvensis  
 . . . . . pimpinellifolia  
 . . . . . spinosissima  
 . . . . . parviflora fl. pl.  
 . . . . . villosa  
 . . . . . centifolia  
 . . . . . damascena  
 . . . . . pumila  
 . . . . . rubiginosa  
 . . . . . muscosa  
 . . . . . rubrifolia  
 . . . . . canina  
 . . . . . semperflorens  
 . . . . . bracteata  
 . . . . . diversifolia; germinibus o-  
 . . . . . vali oblongis; caule petio-  
 . . . . . lisque aculeatis; foliis ter-  
 . . . . . natis pinnatisve, subtus  
 . . . . . glaucis. Vent. Jard. Cels.  
 . . . . . tab. 35.  
 . . . . . kamtschatica ex Hort. Cels.  
 Rosmarinus officinalis  
 Rottbolla incurvata  
 Rubia tinctorum  
 . . . . . var. lucida (1)  
 Rubus idaeus  
 . . . . . odoratus  
 . . . . . canadensis  
 . . . . . fruticosus  
 . . . . . fl. pleno  
 Rudbekia laciniata  
 . . . . . purpurea

(1) *Rubia lucida* L. est varietas *R. tinctorum*, quæ in regionibus calidioribus foliis peremnantibus, & quandoque senis gaudet, quamvis longe frequentius quaternis tantum observetur, ut adnotavit Lam. Enc. Varietas hæc prope Genuam passim occurrit; idemque individuum nunc *Rubiae tinctorum*, nunc *R. lucidæ* characteres, pro varia loci natura, & expositione adsumit.

**Ruellia clandestina**  
 . . . strepens  
 . . . paniculata  
 . . . varians; foliis lanceola-  
 to-ovatis subrepandis, ac-  
 cuminatis glabris; pe-  
 dunculis terminalibus,  
 paucifloris; bracteis im-  
 bricatis inaequalibus.  
 Vent. Jard. Cels. tab. 46.

**Rumex Acetosella**  
 . . . sanguineus  
 . . . Lunaria  
 . . . crispus  
 . . . rosens  
 . . . Patientia  
 . . . acetosa  
 . . . scutatus  
 . . . pulcher

**Ruscus aculeatus**  
 . . . Hypoglossum  
 . . . racemosus

**Ruta graveolens**  
 . . . legitima

## S

**Saccharum officinarum**  
 . . . Ravennae

**Sagittaria sagittifolia**

**Salicornia herbacea**

fruticosa

**Salisburia adianthifolia** (1) Cin-  
 ckgo biloba Lin.

**Salix babylonica**

**Salicula Tragus**

. . . fruticosa

. . . Kali

. . . muricata

**Salvia canariensis**

. . . tiliacfolia

. . . hispanica

. . . officinalis

. . . fol. Inteo varieg.

. . .  $\beta$  aurita

. . . nivea

. . . ceratophylloides

. . . coccinea

. . . Sclarea

. . . runcinata

. . . aurea

. . . formosa

. . . mexicana

. . . Horminum

. . . verbenaca

. . . disermas

. . . viscosa

**Sambucus nigra**

. . . racemosa

. . . Ebulus

**Samolus Valerandi**

**Sansevieria Zeylanica. Alettris hya-**

*cinthoides* Lin.

**Santolina Chamaecyparissias**

. . . rosmarinifolia

. . . pinnata. Foliis pinnatis;

pinnis linearibus ac-

cutis. Fl. ital. fragm.

tab. VI.

(1) *Hujus Plantae efflorescentia Claris. Smithio tandem patuit, unde characterem genericum in Vol. III. Trans. Soc. Linn. p. 33o. sic expressit.*

**Masc. Amentum nudum, filiforme. Antherae incumbentes, dektoides; loculamentis apice tantum connatis.**

**Foem. Solitarii. Cal. quadrifidus persistens. Drapa supera globosa, putamine triangulo. Semen albuminosum bicotiledoneum,**

Saponaria officinalis	Selinum appunium; caule tereti
. . . . . Vaccaria	striato; involucrio universali
. . . . . porrigens	monophyllo; vaginis foliorum
Satureja montana	amplexicaulibus erectis; fo-
. . . . . rupestris	liorum laciniis filiformibus
. . . . . juliana	-mucronatis. Fl. Ital. fragm.
. . . . . Thymbra	Tab. I. (1)
Saxifraga crassifolia	Sempervivum arachnoideum
. . . . . sarmentosa	. . . . . tectorum
. . . . . rotundifolia	. . . . . arboreum
Scabiosa succisa	. . . . . fol. varieg.
. . . . . cretica	. . . . . hirtum
. . . . . leucantha	Senecio elegans
. . . . . columbaria	. . . . . triflorus
. . . . . gramuntia	. . . . . bicolor (2) (plur. Catal.);
. . . . . africana	Foliis ellipticis, carno-
Scandix Cerefolium	sis, duplicato-serratis,
. . . . . odorata	discoloribus. Nob.
. . . . . Pecten	. . . . . vulgaris
Scherardia arvensis	. . . . . Jacobæa
Schinus molle	. . . . . Doria
Scilla peruviana	Serapias cordigera
. . . . . autumnalis	. . . . . Lingua
. . . . . hyacinthoides	Serratula tinctoria
. . . . . amena	Sesamum indicum
. . . . . bifolia	Sida carpinifolia
Scolymus hispanicus	. . . . . rhombifolia
Scoparia dulcis	. . . . . Abutilon
Scorzonera græca	. . . . . Napæa
. . . . . hispanica	. . . . . indica
Scrophularia canina	. . . . . angustifolia
Scutellaria cretica	. . . . . triquetra
Sedum sexangulare	. . . . . planiflora
. . . . . populifolium	. . . . . triloba
. . . . . Cepæa	. . . . . Annoda
. . . . . Dapsiphyllum	Syderitis romana
. . . . . Telephium	. . . . . perfoliata
. . . . . acre	. . . . . cretica
	. . . . . canariensis

(1) *A. S. Chabraci distinctissima species, vaginis foliorum amplexantibus, erectis, foliorum laciniis mucronatis.*

(2) *Speciem hanc foliis subtus intense violaceis, ut in Tradescantia discolor, distinctissimam, nullibi descriptam invenio. De genere vero usque adeo haesitanter recepto nullum jam nunc superest dubium; cum in hoc Horto, hyeme preterito, in Caldario flores, & semina protulerit; unde laciniæ calycis apice sphacelatae, & reliquæ Senecionis notæ mihi se se prodiderunt.*



*Syrderoxylon tenax*  
mite

*Silene Armeria*  
gigantea  
fruticosa  
nocturna  
gallica  
quinquevulnera  
noctiflora  
cerastoides  
Behen  
orchidea  
paradoxa  
nutans

*Silphium trifoliatum*  
perfoliatum

*Sinapis alba*  
nigra

*Sisymbrium Barbarea*

*Sisyrinchium Bermudiana*  
palmifolium

*Smilax aspera*  
fol. angustior.  
varieg.  
rotundifolia ( *S. Salsa-*  
*parilla* aliquorum  
Catal.

*Solanum macrocarpum*  
tomentosum  
coccineum  
virginianum  
Dulcamara  
radicans  
marginatum  
Pseudocapsicum  
corymbosum  
sodoneum  
diphyllum  
Lycopersicum  
Pseudo-lycopersicum  
tuberosum  
lycioides  
indicum

*Solanum triquetrum?*

aethiopicum  
guinense  
capense  
auriculatum  
sanctum  
campechiense  
pyracanthos ) Lam.  
pinnatifidum (1) ) Enc.  
aculeatissimum

*Solidago Virga aurea*  
dubia  
canadensis  
sempervirens  
altissima  
lateriflora  
odorata  
mexicana  
flexicaulis

*Sonchus fruticosus*  
tenuerrimus  
oleraceus

*Sophora japonica*  
aloppecuroides  
australis Podalria  
australis VVild.

*Sorbus germanica*

*Spartium junceum*  
spinosum  
monospermum

*Sphoeranthus indicus*

*Spigelia Anthelmia*

*Spinacia oleracea*

*Spilanthus Acmella*

*Spiraea crenata*  
salicifolia  
hypericifolia  
opulifolia  
Ulmaria fl. pl.

*Filipendula*  
*Stachys germanica*  
circinata  
lanata

(1) *Ludit foliis linearibus integerrimis,*

- . . . . . palaestina  
 . . . . . maritima  
 . . . . . recta  
 Staehliana dubia  
 Stapelia variegata  
 . . . . . hirsuta  
 Staphylea pinnata  
 . . . . . trifoliata  
 Statice Armeria  
 . . . . . cephalotes  
 . . . . . Limonium  
 . . . . . oleaeifolia  
 . . . . . echioides  
 . . . . . minima *S. cuneata* plur.  
 . . . . . catal.  
 . . . . . speciosa  
 . . . . . monopetala  
 . . . . . Thouinii *S. caule herba-*  
*ceo* ; foliis radicalibus  
 alterne pinnatifido-sinua-  
 tis ; corollae laciniis in-  
 termediis capillaribus ;  
 perianthio communi bi-  
 corni. Nob. (1)  
 Sterculia platanifolia  
 Stipa capillata  
 . . . . . Aristella  
 . . . . . tortilis  
 Symphitum officinale  
 Syringa persica  
 . . . . . vulgaris  
 . . . . . fl. albo

## T

- T**agetes patula  
 . . . . . erecta  
 . . . . . lucida ; foliis simplici-  
 bus connatis, ovatis,

argute serratis, cilia-  
 tis. Cav. icon. v.  
 III. tab. 764.

- Tamarindus indica  
 Tamarix gallica  
 Tanacetum vulgare  
 . . . . . crispum  
 . . . . . Balsamita  
 Tarchonanthus camphoratus  
 Taxus baccata  
 Tetragonia herbacea  
 Teucrium aureum  
 . . . . . asiaticum  
 . . . . . Marum  
 . . . . . massiliense  
 . . . . . capitatum  
 . . . . . campanulatum  
 . . . . . montanum  
 . . . . . Pseudo-hyssopus  
 . . . . . Iva  
 . . . . . Chamaedrys  
 . . . . . Chamaepitis  
 . . . . . Scorodonia  
 . . . . . fruticans  
 . . . . . latifolium  
 . . . . . flavum  
 . . . . . Betonicum  
 . . . . . Scordium  
 Thalictrum minus  
 . . . . . angustifolium  
 . . . . . aquilegifolium  
 . . . . . atropurpureum  
 . . . . . medium  
 . . . . . lucidum  
 . . . . . Cornuti  
 Thalinum reflexum. *Portulaca*  
*patens* Lin.  
 Theligionum Cynocrambe  
 Thapsia maxima  
 . . . . . gargarica

(1) Differt a *Statice sinuata*, caule & foliis laevioribus ; perianthio  
 communi bicorni, proprio nullo ; corollae limbo quinquefido, laciniis  
 capillaribus cum majoribus alternantibus. Semina hujus speciei  
 ad Horti Ticinensis Custodem expertissimum J. Scanagatta misit  
 Claris. Thouin, nomine Statice du Desert d'Ana.

**Thesium Linophyllum****Thnja orientalis**. . . . . **occidentalis****Thymus Serpyllum**

. . . . . *citriodorum*  
 . . . . . *Serpyllum*  
 . . . . . *angustifolium*  
 . . . . . *glabrum* Bah.  
 . . . . . Pin. 220.

. . . . . **virginicus**. . . . . **Piperella**. . . . . *vulgaris*. . . . . **Acinos**. . . . . **Mastichina**. . . . . **Zygis****Tilia europaea.****Trachelium coeruleum****Tradescantia virginica**. . . . . *fl. purpureo*. . . . . *erecta*. . . . . *discolor*. . . . . *rosea* ; *erecta foliis*. . . . . *gramineis*; *umbel-*. . . . . *lis terminalibus*. . . . . *paucifloris*; *invo-*. . . . . *lucro diphyllo lon-*. . . . . *gioribus* . Vent.

. . . . . Jard. Cels. Tab. 24

**Trifolium rubens**. . . . . *hybridum*. . . . . *stellatum*. . . . . **Melilotus****Tripsacum dactyloides****Triticum repens**. . . . . *juncum***Trollius europaeus****Tropaeolum majus**. . . . . *fl. pl.*. . . . . *minus***Tulipa gesneriana**. . . . . *sylvestris***Turnera ulmifolia****Turritis hirsuta****Tussilago Farfara**. . . . . *Petasites***Typha latifolia****U****Ulex europaeus****Ulmus campestris****Uniola paniculata****Urtica nivea**. . . . . *pilulifera*. . . . . *urens*. . . . . *dioica***V****Valantia glabra**. . . . . *Aparine*. . . . . *cruciata*. . . . . *hispida***Valeriana rubra**. . . . . *Phu*. . . . . *officinalis*. . . . . *Locusta***Vella annua****Veltheimia viridiflora** VV. *Ale-*  
*tris capensis* Lin.**Verbascum Thapsus**. . . . . *sinuatum***Verbena Aubletia**. . . . . *bonariensis*. . . . . *nodiflora*. . . . . *globiflora*. . . . . *mexicana*. . . . . *triphylla*. . . . . *officinalis***Verbesina alata**. . . . . *fruticosa***Veronica austriaca**. . . . . *longifolia*. . . . . *incana*. . . . . *pinnata*. . . . . **Beccabunga**. . . . . **Anagallis**. . . . . **Cymbalaria**; *foliis cor-*  
*dato-rotundatis, sub-*. . . . . *septemdentatis*; *ca-*. . . . . *lycibus fructus pa-*. . . . . *tentibus, foliolis ova-*. . . . . *tis*; *capsulis hirsutis.*

. . . . . Bertoloni Atti della

. . . . . Soc. Med. V. i. p. 74.

**Viburnum** Tinus  
 . . . . . Opulus  
 . . . . . Lantana  
 . . . . . cassinoides  
 . . . . . strictum Hort. Cels.

**Vinca** major  
 . . . minor fol. varieg.  
 . . . . . flor. dupl.  
 . . . . . rosea  
 . . . . . fl. albo

**Viola** odorata  
 . . . . . fl. albo  
 . . . . . fl. albo pleno  
 . . . . . fl. purp. pleno  
 . . . . . tricolor

**Virea** scabra

**Vitex** Agnus castus

**Vitis** arborea

. . . . . vinifera

. . . . . *quinquefolia* VV. Hedera  
 . . . . . *quinquefolia* Lin.

**Volkameria** inermis

. . . . . aculeata

## X

**Xanthium** fruticosum  
 . . . . . *Strumarium*

**Xeranthemum** annuum  
 . . . . . fulgidum *Gna-*  
*phalium fulgi-*  
*dum* L.

## Y

**Yucca** aloifolia  
 . . . . . gloriosa

## Z

**Zanthoxylon** Clava Herculis

**Zinnia** pauciflora

. . . . . *elegans* Jac. Jc. rar. Z.  
*violacea* foliis ovato-  
 acutis sessilibus sub-  
 connatis; palearum  
 apicibus fimbriato-  
 serratis. Cav. ic. vol.  
 I. tab. 81.

. . . . . multiflora

**Zinania** aquatica

**Zizyphus** vulgaris ) *Rhamnus*  
 . . . . . *Paliurus* ) Lin.